ROSA FOETIDA.

R. *Calicum tubis ovatis pedunculisque hispidis; petiolis aculeatis, aculeis sparsis subrectis; foliolis ovato-acutis, subtus pubescentibus.* Bast. supp. à la Fl. de M.-et-L., p. 29. DC. Fl. franç. 6, p. 534. *Non* Herm. *Dissert.* p. 18. *Non* Allion *Flora ped.* n° 1792.

LE ROSIER A FRUITS FÉTIDES.

DESCRIPTION.

C'est un arbrisseau qui s'élève en buisson à la hauteur de cinq à six pieds. Ses tiges glabres, sont armées d'aiguillons longs, presque droits, épars et rougeâtres, particulièrement sur les branches stériles : ceux qui se trouvent près des stipules sont presque géminés. Les feuilles se composent de cinq, de sept, et par-fois de neuf folioles glabres en-dessus, pubescentes en-dessous, très-entières, souvent échancrées en cœur à leur base, pointues au sommet, doublement dentées, à dents serraturées; elles sont portées par un pétiole velu, glanduleux, muni de quelques petits aiguillons recourbés qui se prolongent souvent jusques sur la nervure principale de la foliole impaire. Les stipules sont diaphanes, bifides, pointues au sommet, et glanduleuses. Les fleurs, assez petites, presque inodores, naissent généralement solitaires; mais on en trouve quelquefois deux ou trois ensemble, réunies à l'extrémité des petites branches qui croissent le long des rameaux principaux. Le tube du calice petit, ovoïde-allongé, le pédoncule qui le supporte ainsi que les divisions pinnatifides du limbe, sont hérissés de poils spiniformes et glanduleux. Les cinq pétales